

### Criteria generali per l'accettazione del donatore

#### Età minima

Sangue intero/ Plasmateresi/ Citoaferesi 18 anni

#### Età massima

Sangue intero  
la continuazione dopo i 65 anni può avvenire, a giudizio del Medico fino a 70 anni  
Plasmateresi/ Citoaferesi  
la continuazione dopo i 60 anni può avvenire, a giudizio del Medico fino a 65 anni

#### Peso minimo

50 Kg

#### Pressione arteriosa

Sistolica tra 110 e 180 mm Hg

Diastolica tra 60 e 100 mm Hg

#### Emoglobina

Sangue intero

≥ 12.5 g/dl nella donna

≥ 13.5 g/dl nell'uomo

Plasma

≥ 11.5 g/dl nella donna

≥ 12.5 g/dl nell'uomo

**Intervallo tra donazioni** 90 giorni tra due donazioni di sangue intero; almeno 14 giorni tra due plasmateresi; 1 mese tra sangue e plasmateresi

#### Numero massimo di donazioni per anno

sangue intero

2 nella donna in età fertile

4 nell'uomo

plasma

massimo 16 donazioni/anno

#### Farmaci

Periodo di Sospensione	Farmaci
finché perdurano le condizioni che ne hanno determinato l'assunzione per tutto il periodo di assunzione	<b>Antiaritmici</b>
15 giorni dall'ultima assunzione	<b>Psicofarmaci e antidepressivi</b>
15 giorni dall'ultima assunzione	<b>Antibiotici</b>
2 mesi dall'ultima assunzione	<b>Cortisonici</b>
permanente	<b>Finasteride</b>
ultima dose 72 ore prima della donazione	<b>Etretinato</b>
	<b>Altri farmaci</b>

### Fattori di Rischio Infettivo

Periodo di Sospensione	Fattori di Rischio
fino a guarigione delle ferite	<b>Interventi chirurgici minori, estrazioni dentarie</b>
per 48 ore	<b>Cure odontoiatriche</b>
	<b>Tattaggi, foratura dei lobi auricolari, piercing</b>
	<b>Agopuntura</b> Idoneo se eseguita con aghi monouso e sotto controllo medico
per 4 mesi	<b>Contatti occasionali, rapporti sessuali a rischio o con partner positivi per anti-HCV o HBV o anti-HIV</b>
	<b>Interventi chirurgici in ricovero ordinario o DH, Procedure endoscopiche</b>
	<b>Trasfusione di sangue, emocomponenti e plasmaderivati</b>
Valutazione da parte del Medico	<b>Assunzione di sostanze stupefacenti per via non venosa</b>
permanente	<b>Trapianti di organi, cornea e dura madre</b>
	<b>Assunzione di sostanze stupefacenti per via endovenosa</b>
	<b>Ormoni ipofisari di origine umana</b>

#### Patologie

Periodo di Sospensione	Patologie
periodo sintomatico	<b>Malattie allergiche e autoimmuni</b>
72 ore dall'ultima dose	<b>Allergie</b>
permanente	<b>Terapia desensibilizzante</b>
	<b>Malattie autoimmuni</b>
	<b>Asma se sintomatico e in terapia continuativa</b>
fino a risoluzione	<b>Malattie Neurologiche</b>
permanente	<b>Vertigini</b>
	<b>Epilessia, Sincope, Neuropatie sistemiche, Psicosi e Demenza, interventi di neurochirurgia del SNC</b>
permanente	<b>Malattie ematologiche</b>
	<b>Sindromi mieloproliferative, eritropatie, leucemie, linfomi</b>
permanente	<b>Malattie cardiovascolari</b>
	<b>Coronaropatie, Aritmie gravi, Vasculopatie Trombosi venose o arteriose ricorrenti</b>
fino alla guarigione	<b>Malattie dell'apparato digerente</b>
permanente	<b>Ulcera peptica</b>
	<b>Calite ulcerosa, M. di Crohn, M. Celiaco</b>

Endocrinopatie e Nefropatie
<b>Malattie della Tiroide, del surrene, del pancreas, dell'ipofisi in caso di patologie neoplastiche e autoimmune</b>
permanente
<b>Nefropatie croniche, Pielonefrite</b>
<b>Diabete se in terapia</b>
Nessuna sospensione
<b>Ipotiroidismo in terapia sostitutiva</b>
<b>Broncopneumopatie</b>
15 giorni
permanente
<b>Bronchite e patologie respiratorie</b>
<b>BPCO grave, Sarcoïdosi</b>

#### Altre condizioni

Periodo di Sospensione	Altre condizioni
fino alla guarigione	<b>Fratture</b>
per tutto il tempo della gravidanza e per 12 mesi dal parto (*) o 6 mesi dall'interruzione	<b>Gravidanza</b>
6 mesi	<b>(*) criterio locale</b>
28 giorni da rientro	<b>Saggio USA e Canada</b>
permanente	<b>Viaggio USA e Canada</b>
	<b>Neoplasie maligne</b>
	<b>Soggiorno in Inghilterra dal 1980 al 1996 per più di 6 mesi complessivi</b>

#### Vaccinazioni

Periodo di Sospensione	Vaccinazioni
per 48 ore	<b>Virus uccisi, tossoidi, vaccini batterici o da DNA ricombinante, vaccinazione per epatite A o B</b>
per 4 settimane	<b>Virus vivi attenuati (Poliomielite, morbillo, febbre gialla, rosolia), BCG</b>
per 1 anno	<b>Vaccinazione contro la rabbia</b>

#### Malattie infettive

Periodo di Sospensione	Malattie infettive
<b>Malaria</b>	
per 6 mesi dal rientro	<b>Soggiorno in zona malarica con o senza profilassi</b>
3 anni	<b>Persone che hanno vissuto i primi 5 anni di vita in zona malarica</b>
Solo per donazioni di plasma	<b>Contagio della malattia</b>
3 anni dalla guarigione	
Solo per donazioni di plasma	
6 mesi dalla guarigione	<b>CMV, EBV, Malattia di Lyme</b>
permanente	<b>Malattie tropicali, Lebbra, Sifilide, HIV, HCV, HBV</b>
	<b>M. di Creutzfeld-Jacob</b>